

癸巳新刊御藥院方

癸巳新刊御藥院方卷第二

較勘無差

治傷寒門

桂苓丸 治冒暑大渴飲水過多伏冷心腹脹滿見
食欲嘔頭眩小便赤少大便滑瀉

桂

赤茯苓 去皮各五兩

右二味爲細末煉蜜爲丸每兩作一十九丸每服一
丸細嚼白湯送下冷水化服亦得

敗毒散 治傷寒時氣頭痛項強壯熱惡寒身體煩
痛及寒壅咳嗽鼻塞聲重風痰頭痛嘔噦寒熱並

皆治之

人參

洗去
盧頭

茯苓

判去
皮

甘草

燉

前胡

去苗
洗秤

芎藭

羌活

去苗
洗

獨活

去
苗

桔梗

柴胡

去
苗

枳殼

楚妙去穰
各三十兩

右為細末每服二分水一盞入生薑薄荷各少許

同煎至七分去滓溫服不拘時候

小柴胡湯

治傷寒溫熱病身熱惡風頸項強急胸

滿脇痛嘔噦煩溫寒熱往來身面皆黃小便不利

大便秘硬或過經來解或潮熱不除及差後勞復

發熱頭痛婦人傷風頭痛煩熱經血適斷寒熱如
瘧發作有時及產後傷風頭痛煩熱此藥並皆治
之

柴胡去蘆頭

半夏湯洗七次

黃芩

人參去蘆頭

甘草炙各三兩

右五味同爲粗末每服三大錢以水一盞半入生
薑五片棗一個擘破同煎至七分濾去滓稍熱
服不計時候小兒分作二服更量大小加減

五積散 調中順氣除風冷化痰飲治脾宿冷腹脇
脹痛胸膈停痰嘔噦惡心或外感風寒內傷生冷

心腹痞悶頭目暗痛肩背拘急肢體怠惰寒熱往來飲食不進及婦人血氣不調心腹撮痛經候不調或閉不通並宜服之

蒼朮洗淨去皮二十四兩 桔梗去蘆頭十一兩 枳殼去穢炒

陳橘皮白去 麻黃去根節已上各六兩 芍藥

白芷 當歸去蘆頭洗 甘草剉

桂皮去粗 半夏湯洗七次 茯苓去皮

川芎三兩上各 厚朴去麩皮 乾薑已上各四兩

一有除桂枳殼二味另為粗末外一十三味同為粗

末慢火炒令色轉攤冷次入桂枳殼末令勻每

服三分水一盞半入生薑三片煎至一中盞去
滓稍熱服如令氣奔衝心脇臍腹脹滿刺痛反
胃嘔吐泄利清穀及疰癰癢癆勝疔小腸氣痛
卽入煨生薑三片鹽少許同煎如傷寒時疫喉
痛體疼惡風發熱項背強痛入蔥白三寸豉七
粒同煎若偏覺惡寒或身不甚熱肢體拘急或
手足厥冷卽入炒茱萸七粒鹽少許同煎如寒
熱不調咳嗽喘滿入棗煎服婦人難產入醋一
合同煎服之並不拘時候

升麻葛根湯 治大人小兒時氣溫疫頭痛發熱肢

體煩疼及疥疹已發未發疑貳之間並宜服之

升麻

葛根 判

甘草 判

芍藥 各十兩

右同為粗末每服三錢用水一盞半煎取一中盞

去滓稍熱服不計時候日進二三服以病氣去

身清涼為度小兒量力服之

金沸草散 治風化痰除頭目昏痛頸項強急往來

寒熱肢體煩疼胸膈滿悶痰涎不利咳嗽喘滿涕

唾稠黏及洽時行寒疫壯熱惡風

荆芥穗 兩

旋覆花 去

前胡 去

麻黃

去根節 各二兩

甘草

炙

赤芍藥

半夏

洗七次用生薑汁浸各一兩

右件同為粗末每服二錢水一盞半入生薑三片

棗一個同煎至八分去滓溫服不拘時候有寒

邪則汗出如風盛則解利

木附湯 治風濕相搏身體疼痛不能轉側不嘔不

渴大便堅硬小便自利及風虛頭目眩重甚者不

知食味

附子

炮去皮臍細切一兩半

白朮

四兩

甘草

二兩 剉炒

右搗白朮甘草為粗末入附子令勻每服三錢水

一盞半入生薑五片棗一個擘破同煎至一盞
 去滓溫服食前此藥暖肌補中助陽氣止自汗
 防已黃耆湯 治風濕相搏客在皮膚一身盡重四肢
 少力關節煩疼時自汗出漉淅惡風不欲去衣
 及治風水客搏脚膝浮腫上輕下重不能屈伸

防已

四兩

黃耆

五兩

甘草

二兩

白朮

三兩

右同為粗末每服三錢水一盞半入生薑三片棗
 一個同煎至一盞去滓稍熱服不計時候服訖
 蓋覆溫臥汗出差

水胡蘆丸 生津液止煩渴利咽噎

人參 乾葛 紫蘇葉 各二錢

烏梅肉 木瓜 甘草 各一錢

右為細末煉蜜和丸每兩作三十九母用一丸綿

裏嚼化嚥津不計時候或新水化服亦得

梅蘇丸 止渴生津液

烏梅肉 白梅肉 乾木瓜

紫蘇葉 各一兩半 甘草 半兩 白檀 二錢

麝香 研一錢

右為末入麝香勻入乳糖淨入兩蜜一兩同煉和

為劑每兩作二十九每服一九細嚼嚥津不拘
時候或新水化服亦得

沉香飲子 治飲冷過多短氣喘促心胸妨悶全可
思食

沉香

兩半

紫蘇葉

兩二

白茯苓

去一皮兩

人參

一兩去蘆頭

右四味咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓

時時服

神解丸 治內外所傷骨節疼痛壯熱憎寒頭疼身

體拘急

朱砂 研

礞砂 研

黃蠟 各等分

右鎔蠟和成劑旋丸如菜豆大每服一丸冷水送下如人行一二里地以熱葱醋粥投汗出解

六一散 治身熱嘔吐泄瀉腸澀下痢赤白治穢閉
淋痛利小便偏主腸胃中積聚寒熱益精氣通九
竅六府津液去留結消畜水止渴利中除煩熱心
躁治腹脹痛補益五臟大養脾腎之氣理內傷陰
痿安魂定魄補五勞七傷一切虛損主癩瘰驚悸
健忘止煩滿短氣藏傷咳嗽療飲食不下肌肉疼
痛治口瘡牙齒疳蝕明耳目壯筋骨通血脈和氣

血消水穀保真元解百藥酒食邪毒耐勞役飢渴
寒熱辟中外諸邪所傷久服強志輕身駐顏延壽
及解中暑傷寒疫癘飢飽勞損憂愁思慮恚怒驚
恐傳染并汗後遺熱勞復諸疾并解兩感傷寒能
令偏身結滯宣通氣和而愈及婦人下乳催生并
產後損液血衰陰虛熱甚一切熱證並宜服之兼
不患妨發吹乳或已覺吹乳乳癰類服卽愈乃神
驗之仙藥也桂有孕婦人不得服恐滑胎也

滑石

六兩
好者

甘草

一兩
微炒

右爲極細末每服三錢蜜少許溫水調下或無

亦得無時日三服或欲冷飲者新水調下亦得
解利發汗煎葱白豆豉湯調下四錢併三四服
以効爲度此藥是寒涼解散熱鬱設病甚不解
多服無害但有益耳

生薑附子湯 治痰冷澀氣胸滿短氣嘔沫頭痛飲
食不消化亦主卒風

附子 炮製去皮
臍細切

每服三錢水二大盞入生薑一十片煎至一盞去

滓溫服空心食前

四君子湯 治煩熱燥渴

行... 七... 精... 照... 登...

白茯苓皮去

人參去頭

甘草炙

白木各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓放溫服

不計時候

白木散 治諸病煩渴津液內耗不問陰陽服之止

渴生津液

白木

人參去頭

茯苓皮去

甘草炙

藿香葉

木香各一兩

乾葛二兩

右為粗末每服三錢水一大盞煎至七分去滓溫

服不計時候

福壽二味散

乾薑用生

石決明各等分

右為細末每用藥一錢用男兒津唾於左手心內調稀稠得所不犯婦人手

桂漿

生蜜三斤

熟水一斗

赤茯苓去皮為末三兩

大麥蘖末半兩

細麴末半斤

桂去蟲皮為細末三兩

杏仁湯浸去皮一百

右用前項藥蜜杏泥并水一處攪勻了和水共煎

得三大紅盃入於磁罐子內或磁瓶內以油子
封口上用數重紙蓋泥固濟入冰窖內三日方
熟綿濾去滓水浸飲之

化水丹 消化水飲

牡蠣二兩 燒

甘草二兩 炒

蛤粉六兩

川烏頭四隻 秤重一兩九錢 炮去皮 臍得淨一兩四分

右為細末醋浸餛餅為丸如梧桐子大每服十五

丸不拘時候溫水下

屠蘇 大辟瘟疫氣令人不染溫病及治傷寒

大黃

小椒去子

桂去皮 粗

桔梗 各一兩半

白朮 一兩八錢

虎杖 一兩錢

川烏頭 生去皮 六錢

右件七味修製畢剉細一處和勻用絳袋子內盛

於十二月晦日日中懸井中沉至泥正月朔日

平明取出袋子放在酒中同煎數沸面向東戶

飲之屠蘇之飲先從小飲至大自意飲之一人

飲一家無病一家飲一里無病飲屠蘇三日後

其滓還置井中能仍歲飲可世無病當家內外

井中皆悉注大藥辟瘟疫氣

自定方 治傷寒大汗出後表證已解心胸大煩滿

欲飲水及吐或下後七八日邪毒不解熱結在裏
表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水
數升者宜服之又治夏月中暑毒汗出惡寒身熱
而渴

石膏洗斤二十

知母一百五十兩

甘草燬七十兩

右爲末每服三錢水一盞半入糯米三十餘粒煎
至一盞濾去滓溫服小兒量力少少與之或加
人參少許同煎亦得食後服此藥立夏後立秋
前可服春時及立秋後并亡血虛家並不可服

桂苓甘露散

治飲水不消嘔吐瀉利流濕潤燥宜

通氣液水腫腹脹泄瀉不能止者兼治霍亂吐瀉
下利赤白止煩渴解暑毒大有奇効兼利小水

白茯苓皮去

白朮

豬苓皮去

寒水石別研

甘草炙

澤瀉各一兩

滑石別研

桂去粗

右件為細末或煎或水調三二錢任意或入蜜少

許亦得

荔枝膏

烏梅八兩

桂一兩

乳糖六兩

生薑五兩
取汁

麝香半錢

熟蜜四兩

右用水一斗五升熬至一半濾去滓下乳糖再熬
 候糖鎔化開入薑汁再熬濾去滓俟少時入麝
 香用如常法服

牛黃七寶丹 治傷寒時疫熱毒暑病心胸痞塞或

發黃發斑狂躁迷悶及久經取轉不較蘊毒滯積

潮熱

牛黃 研

龍腦 研

麝香 別研各半錢

朱砂 研二錢半

白麴 兩半

寒水石 燒通赤二兩半

輕粉 研兩半

右件同研勻滴水和作二十九每服一九澄清水

化下小兒化半丸不拘時候

桂沉漿

紫蘇葉

烏梅肉各一兩

沉香三錢

乳糖六兩

右件四味用水三椀熬至二椀濾去滓入桂漿一升半合和作漿飲之溲濕逐飲順氣止渴

桂苓白朮丸 消痰逆止欬嗽散痞滿塞塞開堅結

痛悶進飲食調和臟腑無問寒濕熱嘔吐瀉痢皆能開發以令遍身流濕潤燥氣液宣平而愈并解酒毒兼療肺痿勞嗽水腫腹脹泄瀉不能止者服

之利止爲度後以隨證調之

乾生薑

棟桂各一分

茯苓去皮

半夏各一兩

白朮

澤瀉

紅皮

湯浸片去
藥各半兩

右爲細末麵糊爲丸小豆大每服二三十丸生薑

湯下日進三服病在膈上食後在下食前在中

卽不計時候或一法更加黃連半兩黃藥二兩水丸

取効愈妙

桂苓甘露散 消飲止渴去煩生津通利小便

桂去粗皮

茯苓去皮

白朮各半兩

甘草

澤瀉

寒水石

石膏各一兩

滑石二兩

右件為極細末欲冷飲者新水調下不拘時候或

只以沸湯亦得

橙皮丸 調中順氣生津止渴

沉香

白木各半兩

木瓜乾者去皮

烏梅肉各一兩

橙皮去白焙乾五錢

白茯苓去皮

糖霜各二兩

乾生薑二錢半

右件搗羅為細末用甘草膏子和成劑每兩作二

十五丸欲作渴水用水化開寒熱溫涼任意飲

之欲噲化亦得

小柴胡加桂湯 治瘧疾先寒後熱兼治支結

柴胡八兩

人參

甘草炙

半夏洗切七

黃芩

桂去粗皮各三兩

右剉如麻豆每服抄五錢匕水一盞半生薑七片

棗二箇煎至八分去滓取六分清汁溫服日三

夜二若渴者去半夏加人參栝樓根同煎服之

交解飲子 治瘧疾辟瘴氣神効

肉豆蔻

草豆蔻

各二個各一個用水和白麴裏煨赤色去麴各

一個生用

厚朴方二寸

一半用生薑汁塗炙熟一半生用

甘草大者熟一寸半生用

生薑二塊如棗各一塊用濕紙裹煨熟一塊生用

右件生熟各破剉碎同勻每服分一半用水一椀

煎至一大盞去滓溫服空心

七棗散 治脾寒瘧疾

川烏頭大者一箇炮良久移一處再炮凡七次炮去皮臍

右為細末都作一服用大棗七箇生薑十片葱白

七寸水一椀同煎至一盞疾發前先食棗次溫

服只一服差雖然烏頭性熱以七處炮熟散其

熱性服之必効

柴胡 栝樓根湯 治瘧疾往來寒熱煩渴引飲

柴胡 兩三分 去苗 黃芩 去黑心 人參 去蘆頭

甘草 炙到各三分 栝樓根 兩到二

右五味搗篩為末每服五錢水一盞半生薑五

片棗二枚同煎至一盞去滓不計時候細細服

七珍散 治瘧後及傷寒中暑後宜服此調胃養氣

進食此方溫平不熱服之十日外飲食倍常

人參 去蘆頭 白朮 黃耆

山芋 白茯苓 去皮 粟米 炒

甘草 炙已上各半兩

右搗羅爲細末每服二錢水一盞生薑二片棗一

个同煎至七分去滓食前溫服

草果飲子 治寒熱往來煩渴頭痛或但寒但熱方

草果子仁四枚

人參去薑頭半錢

半夏一十三枚中樣者沸

湯浸洗七次

甘草炙半錢

大棗三枚

烏梅三枚去核

生薑三寸一塊

右件咬咀用水一大碗同煎至一盞去滓五更時

溫服

瓜蒂散 治太陽經頭痛寒熱方

瓜蒂十枚

川山甲鱗一片尾上焙焦

右為細末每用一劑耳許右鼻內噴大有神効

治瘡方。如合時具冠帶向神堂前旋看呪曰

弟子不為自身為五姓瘡病

白殭蠶一个直者切作七段用綿裹定然為丸用朱砂為衣

右只作一服日未出面向東用左手插寅文用桃

柳枝煎湯送下

香蘇散 治四時瘟疫傷寒

香附子四兩慢火炒 陳橘皮二兩不去白 甘草一兩

香蘇葉四兩

右為麤末每服三錢水一盞煎至七分去滓熱服

不抱時候日進三服

竹葉石膏湯 傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐

淡竹葉半把秤 石膏四兩并碎 人參

甘草各半 麥門冬一兩半 半夏二分半洗

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半入粳米

百餘粒煮取八分米熟湯成去滓溫服

五苓散 治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口燥

咽乾煩渴飲水或水入即吐或小便不利及汗出

表解煩渴不止者宜服之又治霍亂吐利躁渴引

飲

澤瀉剉二十兩 豬苓去皮一十五兩 桂去粗皮一十兩

茯苓去皮二十五兩 白朮去蘆頭一十五兩

右為細末每服二錢熱湯調服不計時候服訖多

飲熱湯有汗出即愈又治瘧熱在裏身發黃疸

濃煎茵陳湯調下食前服之疸病發渴及中暑

引飲亦可用水調服

大順散 治旨暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不

分清濁相干陰陽氣逆霍亂嘔吐臟腑不調

甘草剉長一尺許三十斤 乾薑 杏仁去皮尖

桂去粗皮各四斤

右先將甘草用白沙炒及八分黃熟次入乾薑同炒令薑裂次入杏仁又同炒候杏仁不作聲爲度用篩隔淨後入桂一處搗羅爲散每服二錢水一中盞煎至七分去滓溫服如煩躁卽冷服不計時候以沸湯點服亦得

香薷丸 治大人小兒傷暑伏熱躁渴昏悶頭目昏眩胸膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體倦怠不思飲食或發霍亂吐利轉筋並宜服之

香薷土去

紫蘇莖葉並用
去粗梗

乾木瓜各一兩

丁香

白茯苓木去

藿香葉土去

甘草剉炙

檀香剉已上各半兩

右爲細末煉蜜和丸每兩作三十九每服一九至

二九細嚼溫湯下或新汲水化下亦得小兒服

半丸不計時候

薑木湯 溫和中外退除寒濕治陽虛裏寒外挾風

冷頭痛惡風戰慄多汗風濕相搏身體疼痛腰背

強直轉側不能又療食寒飲冷內傷脾胃嘔逆吐

痰不思飲食

川薑炮

白朮炒

茯苓各一兩

附子炮去皮臍

甘草炙各半兩

右爲麤末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫熱服不計時候

豬苓湯 治脈浮煩渴不利小便不分

豬苓 澤瀉 滑石

赤茯苓 阿膠 各等分

右爲麤末每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫

服不拘時

丹砂丸 治咳寒溫瘴更作證候悉皆治之

丹砂 研一分 常山 搗末三分

右件二味研勻煉蜜爲丸如梧桐子大先一日一

更時服三九溫米飲送下更作日平且時服三九溫米飲送下

茯苓桂枝白朮甘草湯 治心下逆滿氣上衝胸時

發煩渴

白茯苓去皮四兩 甘草炮 白朮各二兩

官桂去粗皮三兩

右咬咀每服五分水一大盞煎至七錢去滓溫服

不拘時候

增損白朮散 生津止渴順氣下痰

白朮 葛根 茯苓去皮

藿香葉

人參

木香各一兩

陳皮二兩

乾生薑一錢

右爲麤末每服五錢水一大盞半煎至七分去滓

溫服不計時候或涼服亦得

百解丸 解內外傷頭痛壯熱增寒腹脹喘急

辰砂研半兩

硃砂研一分

巴豆去皮心膜出油一錢

黃蠟兩半

右除黃蠟外同研令勻入前黃蠟溶開和成劑丸

如菜豆大每服二九新水送下後少時用熱粥

投之汗出立愈

御藥院方卷第二

癸巳新刊御藥院方卷第三

較勘無差

治一切氣門上

平胃散 治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺
痛口苦無味胸滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色
萎黃肌體瘦弱怠墮嗜臥體重節痛常多自利或
發霍亂及五噎八痞膈氣反胃並宜服之

厚朴 去麩皮薑汁炒 蒼朮 去粗皮米汁浸一宿五斤

陳皮 去白三斤二兩 甘草 剉炒二兩 人參

茯苓 各二兩

右為細末每服二錢以水一盞入生薑二片乾薑
一个同煎至七分去薑棗稍熱服空心食前入
鹽一捻沸湯點服亦得常服調氣煖胃化宿食
消痰飲辟風寒冷濕四時非節之氣或以棗肉
為丸小豆大每服五十九溫生薑湯送下空心

食前服

思食丸 生津大進飲食

烏梅肉 大麥蘖 神麩碎炒各一兩

乾木瓜 桂去粗皮 茯苓去皮

人參去蘆頭各半兩 乾生薑二錢 甘草炙三錢

右爲細末煉蜜和丸每兩作一十九丸每服一九細嚼白湯下不以時候日進三服或作小丸如桐子大每服一九亦可

木香三稜丸 治胸膈痞悶心腹脹滿脇肋疼痛寬

中順氣化痰消食

木香兩一

三稜兩二

蓬莪朮兩二

大麥蘖兩四

神麴兩二

白朮兩四

陳皮兩二

乾薑兩二

黑牽牛兩六

一方用牽牛頭末 取六兩

右爲細末生薑汁麵糊和丸如梧桐子大每服三

五十九丸食后生薑湯下

助氣丸 治諸膈氣三焦痞塞升降陰陽蠲去寒濕

胸膈滿悶背脊引痛心腹膨脹諸虛動氣久而不

散蘊結成積疰癖氣塊飲食不下嘔吐痰逆噫氣

吞酸氣短煩悶並皆治之常服去停飲和脾胃進

飲食寬中順氣消積滯

京三稜 炮

蓬莪朮 炮各二斤

白朮

青皮 白

陳皮 去白各十五兩

檳榔

枳殼 去穢炒

木香 各十兩

右件八味同為末水煮麵糊為丸如梧桐子大每

服五十九溫熟水下不拘時候

玄胡丸 解化傷滯內消飲食治吐利腹脹心腹刺

痛癥瘕結氣蟲煩不安調順三焦安和脾胃

玄胡

當歸

青皮去白

雄黃飛

蓬莪茂煨紙

檳榔

木香各四兩

荆三稜六兩

右為細末入雄黃勻水麵糊為丸如梧桐子大每

服三十九生薑湯下不拘時候

木瓜湯 調氣利膈消痰止嗽治胸膈煩悶口乾多

渴治脚氣

木瓜片一斤切作去皮子

鹽白好者

甘草

生薑切作片各四兩

右一處拌勻磁盒器內淹一宿焙乾搗羅為細末每服一分沸湯點服不拘時候

思食調中丸 治脾胃久弱三焦不調胸膈痞悶肢

體倦怠嘔逆惡心飲食進退氣道不勻

神麴炒

麥蘖炒

半夏麴

陳皮去白

烏藥各一兩

檳榔

人參各三分

木香

沉香各半兩

白朮半一兩

右爲細末蜜調白麵糊爲丸如梧桐子大每服三十丸食前溫米飲下

治中湯 治脾胃傷冷物胸膈不快腹病氣不和

青皮白法

陳皮白法

甘草炙

人參去頭蘆

白朮

乾薑炮各等分

右爲麤末每服三分水一盞同煎至七分去滓溫服食前

沉香降氣丸 治胸膈痞悶氣不升降飲食減少肢

體怠墮嘔噦惡心臍腹疼痛常服和脾胃進飲食

利胸膈

沉香半兩

香附子五兩去毛

蓬莪茂剉炒

木香各二兩

甘草七兩輕炒

豆粉九兩輕炒

薑黃八兩洗淨焙半

右為細末水浸蒸餅為丸如櫻桃大却以本末為

衣每服三二九至五九細嚼生薑湯下溫水亦

可不以時候

三腕痞氣丸 治三焦痞滯氣不升降水飲停積不

得流行脇下虛滿或時刺痛並宜服之

木香 白豆蔻去皮

青皮去白

陳皮去白

荆三稜一兩炮各

大腹子三分

半夏

湯洗七次二兩

縮砂仁

檳榔

沉香

各半兩

右爲細末水麪糊和丸如梧桐子大每服三十九

漸加至五六十丸陳皮湯下食後

丁香和胃丸

治脾胃不和中脘氣痞胸膈停痰嘔

吐惡心脇肋刺痛飲食無味肢體倦怠常服溫中

和胃止嘔進食

丁香

木香

沉香

各半兩

藿香葉

白茯苓皮去

白豆蔻人

陳皮白去

白朮

人參已上一各一兩

半夏 薑製 三兩

右件同為細末生薑汁麵糊和丸如梧桐子大每

服三十九至五十九煎生薑湯下不拘時候

養胃進食丸 治脾胃虛弱心腹脹滿面色萎黃肌

肉消瘦怠墮嗜臥全不思食常服滋養脾胃進美

飲食消痰導氣去風寒暑濕冷邪氣

人參 去蘆 頭

甘草 剉各 一兩

白朮

白茯苓 去皮 各 二兩

厚朴 三兩 去粗皮 生薑製 炒

陳皮 去白 一兩 半

神麴 炒 二兩 半

大麥蘖 炒 黃 一兩 半

蒼朮 五兩 去粗皮 泔浸

右爲細末水麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸
至五十丸食前用溫生薑湯下或粥湯下亦得
調胃散 療陰陽氣不和三焦痞格五勞七傷山嵐
瘴氣八般瘧疾四時傷寒頭目肢節疼痛心腹脹
滿嘔吐惡心痰涎咳嗽手足虛腫五種膈氣噎塞
寒熱水瀉諸痢婦人胎前產後羸勞脾胃不和飲
食減少並皆主之

藿香

甘草炙

陳皮白法

半夏麴

每一兩用生薑三兩半

厚朴

每一兩用薑一兩拌製

右五味各二兩同爲細末每服二分水一盞入生

薑二片同煎至七分和滓溫服不拘時候

白豆蔻散 治脾胃氣弱不進飲食

白豆蔻人

厚朴薑製

白朮

沉香

陳皮白去

甘草炙各等分

右為細末每服二錢水一盞入鹽少許同煎至七

分和滓熱服食前

杜翰林枳實丸 疎導老人及虛家風氣痰實腹肋

有妨諸飲癖積

枳實麩炒

赤茯苓

人參

檳榔各一兩

白朮半兩

黑牽牛八兩

右爲細末稀麵糊爲丸如梧桐子大每服食後以
橘皮湯下十五丸至二十九漸加如要不動時
臨臥熟水下五丸至十九別一方加木香半兩

逍遙丸 治膈實氣痞痰實喘促

半夏 湯洗七次 焙三兩 枳實 麩炒 檳榔

赤茯苓 去皮各一兩

右爲細末生薑汁糊爲丸如豌豆大每服二三十

丸食後溫生薑湯下

通膈丸 治胸中氣痞不通水飲停滯

檳榔 三兩 枳實 四兩 麩炒

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十九至五十九生薑湯下溫水亦得食後

赤茯苓丸 治痰飲氣痞

赤茯苓皮去

檳榔

枳實麩炒去核

白朮

半夏麩各等分

右爲細末生薑汁麵糊爲丸如梧桐子大每服五十九溫生薑湯下或風眩頭痛則荆芥湯下食

後

香橘湯 療一切氣不快之病服藥不下者

白朮

枳實生用

香附子大者去鬚

陳皮去白各四兩

甘草炙三兩

右爲細末每服二錢入鹽少許沸湯點或用生薑

棗煎尤妙如傷風用葱白二寸生薑五片棗二

枚水一盞煎至七分溫服不拘時候

陳橘皮湯 治胸痺連心氣閉喉中塞不通

陳橘皮去白

桂去麤皮各二錢半

赤茯苓去黑皮

枳殼麩炒去穰

栝樓實去皮各半兩

甘草炙一兩

右爲麤末每服五錢匕水二盞煎取一盞去滓

心溫熱服日午臨臥各一服

調胃丸 療陰陽氣不和三焦痞隔五勞七傷山嵐

毒氣八般瘧疾心腹脹滿嘔吐惡心痰涎咳嗽手足虛腫五種膈氣噎塞寒熱水瀉諸痢脾胃不和飲食減少並皆治之

藿香

陳皮白法

甘草炙

半夏麩

厚朴薑製各二兩

右爲細末生薑麩和丸如梧桐子大每服五十丸食前生薑湯下

木香調中丸 治因飲食不調腸胃致傷心腹疼痛兩脇脹悶臟腑泄瀉米谷不化腹中雷鳴不思飲食或下膿血或便赤水並宜服之

木香

青皮白去

陳皮白去

檳榔

肉豆蔻麩裏煨
熟去

京三稜炮

訶子皮

草豆蔻人各一
兩

右件爲細末水麩糊和丸如梧桐子大每服六十

丸食前熱米飲送下

枳實理中丸 治中脘痞滯氣不宜通積寒停飲食

入不化

人參

乾薑炮

枳實炒

白朮

甘草炙

白茯苓去皮各
一兩

右爲細末煉蜜和丸每兩分作四丸每服一丸水

一盞同煎至八分去滓熱服不計時候

來復丹 破痞開結分正陰陽治中滿不受攻擊下

虛不任峻補並宜服

硫黃 細研甘草水酒令潤

消石 細研用厚朴水酒令潤

右二味相和拌令勻同淹少時於文武火上炒令

二味氤氳相結取出

五靈脂

玄精石

青皮 去白

陳皮 去白各一兩

右為細末生薑汁麴糊和丸如梧桐子大每服三

十丸食前生薑湯下

理氣丸 治胸中噎塞氣滯不通酒食所傷常服消
導滯氣

枳殼 麩炒
去穰

蓬莪朮 各半
兩

半夏 洗七
次

薑黃

甘松 去土各
二錢

陳皮 白去

大麥蘖 炒各七
錢半

右爲細末水麪糊和丸如梧桐子大每服五十九

煎陳皮湯下食後

沉香餅子 治食飲停積胸膈痞滿腹脇疼痛嘔吐

不止

京三稜

蓬莪朮

青皮

陳皮

紅豆

訶子煨

縮砂人

半夏

芫花醋炒

乾薑

檳榔

薑黃

巴豆和皮

益智去皮為粗末煨
火炒令褐紫色

桂去皮

木香

藿香葉

沉香

硃砂另研細已
上各等分

右件一十九味同為細末打白麵糊和丸如小豆

大捏作餅子每服七餅子至十餅子更忌虛實

加減溫生薑湯下食後服

木香順氣丸

治停飲遲化中氣不和

京三稜 炮

石三稜

鷄爪三稜

檳榔

木香

陳橘皮 去白

半夏

生薑製

人參 去蘆頭

白茯苓 去皮

蘿蔔子

微炒已上 各一兩

白豆蔻人

縮砂人

各半兩

黑牽牛

微炒頭末五兩

右件爲細末生薑汁麵糊和丸如梧桐子大每服

四十九加至五十九食後溫生薑湯下

順氣寬中丸

治陰陽不和三焦痞膈氣行澁滯中

滿不快咽噎悶恚氣奔急肢體煩倦可欲飲食常

服宜通氣血

枳實炒

檳榔

京三稜煨

蓬莪術煨

大麥蘖炒

人參去蘆

桑白皮去粗皮

甘草錢七

右件同為細末每服二分入鹽末少許生薑二片

沸湯點服不拘時候

小沉香丸 和中順氣嗜食消痰又治飲酒後乾嘔

痰涎氣噎痞悶宜服之

沉香六錢

香附子去毛 甘草炙

舶上丁香皮二兩

縮砂仁四錢

益智人微炒

甘松去土

蓬莪朮

錢

右為細末湯浸餅為丸如梧桐子大每服三十

丸至四十九食後溫生薑湯下或嚼破更妙

分氣丸 治胸膈氣痞痰實不化宜服之

木香

青皮白去

陳皮白去

白豆蔻人

縮砂仁

京三稜切炮

蓬莪朮

切炮

萹澄茄

蘿蔔子

枳實

麩炒各一兩

黑牽牛

炒二兩

右件一十一味為細末麵糊為丸如梧桐子大每

服五十九生薑湯送下食後

神保丸 治心膈痛腹痛血痛腎氣脇下痛大便不通氣噎宿食不消並皆治之

木香

胡椒二錢半

巴豆十個去皮心膜研

乾蠟七枚

右件四味爲末湯浸餗餅丸如麻子大硃砂爲衣用二錢每服三丸心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑煎湯下血痛炒薑醋湯下腎氣脇下痛茴香酒下大便不通蜜湯調檳榔下氣噎木香湯下宿食不消茶酒漿飲任下

和中益氣丸 治脾胃不和氣不升降嘔吐減食

苦吞酸胸滿短氣肢體怠墮面色萎黃中焦虛痞
不任攻擊藏氣久寒不受峻補又療心膈福福如
滿五飲停滯不散常服和中益氣進美飲食或大
便不通尤宜服之

木香

丁香各半兩

肉豆蔻

茴香微炒

京三稜炮

桂皮去毒

白豆蔻人

人參去蘆頭
各一兩

縮砂人二兩

青皮去白

陳皮去白
各四兩

右爲細末白麵糊和丸如梧桐子大每服六十五
至七十九食後溫生薑湯送下

小橘皮丸 調中順氣寬膈進食治心腹痞悶腹脇
 脹滿飲食遲化嘔噦惡心口苦無味肢體煩倦傳
 導不調或秘或泄

橘皮去白

木香

縮砂人

檳榔各二兩

青皮去白

半夏六兩湯洗七次

右為細末生薑汁麩糊和丸如梧桐子大每服六
 七十九食後溫生薑湯送下

導滯丸 治心腹痞滿脇肋刺痛嘔吐痰水不思飲
 食常服和中順氣消穀嗜食逐飲滲濕

黑牽牛微炒取頭末四兩

檳榔半兩

青皮 去白 二兩

木香 二錢

胡椒 兩半

三稜 一兩

丁香皮 一兩

右爲細末入牽牛頭末令勻薄麵糊爲丸如小豆

大每服三十九至五十九食後生薑湯下

三和丸 治三焦不和氣不升降心胸痞悶脇肋疼

痛因傷冷物傳化失常

枳實 製 妙

檳榔

半夏 湯洗各 二兩

木香

青皮 去白

陳皮 去

赤茯苓皮 去

丁香皮

蘿蔔子 炒

白木 各一兩半

京三稜 四兩

蓬莪朮 三兩

白豆蔻人

沉香

桂去粗皮

藿香各一兩

黑牽牛一斤微炒搗細頭末取半斤

右為細末酒麴糊為丸如梧桐子大每服三十九至五十九食後生薑湯下

調中丸 治脾胃不和內挾濕煥煩燥發渴不思飲

食頭目昏眩小便不清胸膈悶痞脇肋臃脹

赤茯苓去皮

白朮

陳皮去穢

桔梗

豬苓去皮

澤瀉

黃芩

大黃

桂去粗皮各一兩

枳殼去穢

葛根

木通各一兩

半夏

湯洗

滑石

各一兩

黑牽牛

生用六兩

右為細末水煮薄麵糊為丸如梧桐子大每服三五十丸不拘時候溫水送下

枳殼丸

治中焦氣澁胸膈痞悶食飲遲化四肢困

倦嘔噦惡心常服升降滯氣消食化宿祛痰逐飲進美飲食每服五十丸溫生薑湯送下食後

京三稜

炮

蓬莪茂

炮各二兩二錢

白朮

青皮

去白

陳皮

去白

白茯苓

去皮各一兩半

檳榔

木香

枳殼

麸炒去穢

半夏

湯洗七次各一兩

黑牽牛

炒三兩

右件爲細末水麩糊爲丸如梧桐子大

橘皮枳殼湯 治胸膈氣痞短氣噎悶不得升降

枳殼麩炒
去穰

半夏不製各
二兩

陳皮不
去白
三兩

人參一
兩

右各剉碎每藥一兩用泉水一升生薑片子十餘
片同煎至八分一盞去滓稍溫服如大便澀入
白蜜少許食後大劑如上喘用東流河水更妙
此是半夏湯古語右四味用泉水五大升入白
沙蜜四兩調勻用杓揚藥水二百四十遍煮取
一大升去滓分作三服一日常服盡食後服之

氣寶丸 治一切滯氣腹中積聚心膈痞滿脹悶喘

急及風邪久滯痰涎咳嗽酒食有傷脾胃滯氣勝

脫寒氣攻注體背腰脊痛重不可俛仰大行順一

切滯氣為氣藥之寶因名氣寶

船上茴香

煉淨銀石器內用紙隔炒香二兩

陳皮

湯去白焙一兩

大檳榔

兩

木香

一分四味同研羅為末

黑牽牛

四兩煉淨

用吳茱萸二兩慢火同炒茱萸焦只取牽牛子一向并取末二兩

右件藥末同共拌勻煉蜜和劑為丸如梧桐子大

每服十九至十五丸米飲或木香湯下有痰即

用檳榔末半分水半盞煎數沸放溫下藥欲微

疎利加至三十九至四十九看虛實稍空腹服

之

法製生薑散 治飲酒過多或生冷停滯嘔逆惡心

不欲飲食

生薑

十兩切作片用青鹽炒過再白麴拌過焙乾用之

桂皮

去粗

青皮

去白

陳皮

去穢

半夏

生薑製

白朮

各一兩

丁香

木香

葶澄加

各二兩半

縮砂人

白豆蔻人

白茯苓

各一兩半

甘草

炙

葛根

各半兩

右件為細末每服一二分不拘時候溫酒調下

丁皮丸 行滯氣利胸膈進飲食

丁香皮 陳橘皮白法 京三稜煨切

檳榔各一兩 青木香一分 麝香別研二兩

蓬莖茂煨切半兩

右件搗羅為麤末微炒再搗為細末水煮麪糊和

丸如菉豆大每服七丸至十九不計時候溫生

薑湯送下胸膈滿悶用橘皮湯嚼破十九下七

丸或加至六十九至八十九如胸中滿悶用橘

皮湯嚼破二十九下五十九不計時候

荆蓬煎丸 破痰癖消癥塊及冷熱積聚胃膈疾悶

通利三焦升降陰陽順一切氣消化宿穀

荆三稜二兩到酒浸冬一日夏一日蓬莪茂二兩到酒浸冬三日夏一日

日二味用去皮巴豆二十片同於銀石器內上文武火炒令乾黃色為皮揀去巴豆不用

木香 枳殼麩炒去穰 青皮湯浸去白

川茴香微炒 檳榔剉已上各一兩

石件藥七味修製畢搗羅為細末水煮麵糊和丸

如豌豆大每服三十九溫生薑湯下食後

商殼丸 治胸膈痞滯氣不宜暢破痰逐飲

商枳殼麩炒片積二兩 大皂角去皮子酥炙黃色二兩

青皮白去 半夏洗七返 檳榔

木香 各半

右件搗羅為細末生薑汁作薄麴糊和丸如豌豆

大每服四五十丸食後溫生薑湯送下

逐氣丸 治脾胃停飲攻注腹脇痞滯疼痛或停痰

飲留漬胸膈痞悶不快或欬或喘并水氣流注四

肢浮腫及大腹滿

沉香 二錢 破故紙 微炒 檳榔 各半

郁李人 五枚 黑牽牛 四兩 一半生

大皂角 一十錠 水浸捷授盡濾去滓慢火熬成膏

熱如稀餈相似

右將前五味為細末用皂角膏和丸如梧桐子大
 每服十五丸至二十九丸生薑湯下食後如欲瀉
 利臨時覷虛實加減服之若治腫滿及腹脹用
 葱白湯送下

木香湯氣丸 治胸膈氣痞痰實不化

木香

青皮

陳皮

白豆蔻人

縮砂人

荆三稜

炮

蓬莪茂

炮

萹澄茄

蘿蔔子

枳實

各一兩已上

威靈仙

去土三兩

右為細末水麴糊為丸如梧桐子大每服五十丸

食後生薑湯送下

沉香散 治氣游不通利飲食不得息者

沉香

木通

白牽牛炒

青皮白法

枳殼各一兩

右為麤末每服五錢水一盞半入生薑五片同煎

至七分去滓稍熱服食後

七氣湯 治虛冷上氣及寒氣熱氣怒氣悲氣喜氣

憂氣愁氣內結積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲

食時發時止此藥主之

半夏湯洗七次切作片

人參去蘆頭

桂去邊皮 甘草炙

右為麤末入半夏令勻每服三錢以水一大盞入

生薑三片煎至七分去滓稍熱服食前

木香三稜九 治脾胃氣弱則所食之物不能腐熟

又與新穀相兼宿滯腹內噫氣生熟腹脹膈悶

胸刺痛此藥寬利胸膈消化宿食

木香 桂去粗皮 青皮去白

陳皮去白各半兩 京三稜煨 茱煨各三分

大麥蘖炒 檳榔各一兩

右為細末麵糊和丸如梧桐子大每服三五十九

食後生薑湯下

鷄舌香丸 治傷冷腹脹痞悶疼痛嘔逆痰水

黑牽牛

炒取頭末四兩

京三稜

炮一兩半

丁皮

檳榔

木香

各一兩

青皮

二兩

胡椒

兩半

右為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十

丸食後生薑湯下

小分氣丸 消滯氣利胸膈止心疼化酒食治毒腹

脇脹滿

荆三稜

醋浸一宿切作片焙乾用

牽牛

微炒

大戟 各三兩
細剉炒

芫花 以醋炒

甘遂 各二兩
碎炒黃色

官桂 去皮
一兩

右同杵為末以醋煮麵糊為丸如菉豆大每服十

丸煎陳橘皮湯下不嚼破如大瘕腹脹膨滿氣

滯如惡行動漸加丸數日進三服以微利為度

感應丸 治久積滯氣胸膈痞悶噫氣吞酸嘔逆惡

心脇肋脹滿心腹痞痛水穀不消便利膿血疝瘕

氣塊發作有時內傷脾胃停飲不散飲食無味並

皆治之

木香 去蘆頭

揀丁香 各一兩半

肉豆蔻 二十

乾薑一兩炮製

巴豆七十个去皮膜心研細出盡油如粉

百草霜二兩研

杏人揀肥者去雙仁一百四十個去尖湯洗一宿去

皮研極爛如膏

右七味除巴豆粉百草霜杏人三味外四味搗爲

末與前三味同拌研令細用好蠟匾和光將蠟

六兩溶化作汁以一重綿濾去滓更以好酒一

升於銀石器內煮蠟溶滾數沸傾出候冷其蠟

自浮於上取蠟稱用丸春夏修合用清油一兩

於銚內熬令沫散香熟次下酒煮蠟四兩同化

作汁就鍋內乘熟拌和如前項藥末秋冬合清

油一兩半同煎煮熬作汁和置藥末以劑分作
 小錠子以油單子裹之每服旋丸如菉豆大五
 七丸食後溫水下量臟腑虛實加減服之每兩
 作五錠

蓬莪茂丹 治久患癰疽積聚心腹疰悶飲食減少

四肢困倦欲成勞瘵

蓬莪茂

京三稜

木香

白芍藥

鱉甲

各半兩

白朮

人參

各一兩

當歸

二錢半

右件同為細末用浸餛餅為丸如豌豆大每服三

十九食後溫粥飲下常服調和榮衛美進飲食

消精聚長肌肉

降氣檳榔丸 調順三焦升降陰陽美進飲食潤腸

去燥

檳榔二兩

杏人皮一兩湯浸去尖熬炒

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服五十九食後溫

生薑湯送下

集香丸 消積磨塊去痰療癖治一切積滯不拘老

弱虛損者得皆服餌

附子

二个各重五錢半以上者須得正坐好者炮裂去皮臍剉作窠兒

硃砂半兩水化開
盡了內焙乾

木香七錢

草撥直者
一兩

破故紙炒
一兩

右將飛過硃砂末分在附子裏內却用剝出附子

末蓋口用和成白麵裹約半指厚慢火內燒勻

黃色去麵為末却將元裏附子麵再為細末醋

調糊為丸如菜豆大每服十五丸至二十九食

後生薑湯下

木香三稜丸 治宿食不消心腹痞悶噫氣吞酸破

痰癖消積塊順氣進食

木香兩半

丁香一分

京三稜酒浸
一宿

蓬莪茂

一宿

枳殼

去穢

青皮

去白

川棟子

剉

茴香

各一兩

巴豆

二十个去皮同前六味炒黃色不用巴豆

朱砂

半兩

右件八味同爲細末醋煮麵糊爲丸如菜豆大朱

砂爲衣每服十五丸至二十九生薑湯下食後

木香分氣丸 善治脾胃不和心腹脹滿兩脇膨脹

胸膈注悶痰嗽喘息醋心乾嘔咽喉不利飲食不

化並皆治之大有效

木香

檳榔

青皮

去穢

陳皮

湯浸去白

薑黃

玄胡

荆三稜 濕紙裹炮香 為度捷碎

蓬莪茂 製

乾生薑

當歸 切

白木

赤茯苓 去皮

肉豆蔻 已上各 等分

右件一十三味為細末白麵糊為丸如小豆大每

服三四十九食後生薑湯送下日進三服忌馬

齒生茄子秋冬加丁香為妙

酒癥丸 善療男子婦人一切酒食所傷日久成積

心腹脹滿不思飲食四肢無力時發寒熱涎痰咳

嗽兩脇刺痛及肚裏疼每服兩丸食後細嚼燒生

薑溫酒送下傷食後溫水下心氣痛醋湯下若取

轉使物隱破兩丸臨臥冷水送下量虛實加減丸
數常服食後一丸用茶酒任下有孕婦人不可服

寒食麵斤半

神麴兩

雄黃二錢

巴豆

五十個去皮
心膜不去油

右同爲細末滴水爲丸如梧桐大窵乾用殼糠同
藥丸一處炒令糠焦爲度每服二三丸茶酒任
下不拘時候

檳榔枳殼丸

寬中利膈行滯氣消飲食治胸膈噎

塞腹腸脹滿心下痞痛大小便不利及一切氣滯
不勻

檳榔

木香各四錢

丁香皮

厚朴製

青皮

陳皮

當歸

玄胡

枳殼

荆三稜

蓬莪茂

雷丸已上各半兩

蘿蔔子炒一兩

牽牛二兩

右為細末醋麵糊和丸如梧桐子大每服五六十

丸食後生薑湯下

人參湯 治諸氣咽寒憂結不散

人參

赤茯苓去黑皮

白朮

桂去粗皮

京三稜炮

甘草炙

枳殼 去穰 欬炒

訶梨勒皮 炒

陳橘皮 湯浸去白皮焙

檳榔 剉各一兩

木香

草豆蔻 去皮各半兩

右一十二味麤搗篩每服五錢水一盞煎至七分

去滓溫服食後

通膈散 治胸中氣痞不通水飲停滯

檳榔 二兩

枳實 欬炒 四兩

右爲細末每服二錢食後濃煎生薑湯調下

寬膈丸 療氣不升降胸膈痞結

木香

京三稜 煨

青橘皮 去白各半兩

半夏二兩湯洗七次 大腹子二錢半

右為細末生薑汁麴糊為丸如梧桐子大每服七

十九食後生薑湯下

法製陳皮 消食化氣寬胸利膈每服不以多少細

嚼咽津無時

陳皮半斤去膜淨四兩切作條子

茴香二兩

青鹽四兩 甘草二兩炙

乾生薑半兩

烏梅肉兩半 白檀二錢半

右件除陳皮外並為細末用水一大椀藥末三兩

同陳皮一處慢火煮後陳皮極軟控乾少時別

用乾藥末拌勻焙乾

育氣湯 通流百脈調暢脾元補中脘益氣海思進

飲食大益臟虛疼積祛陰寒止腸鳴

白朮

丁香

人參

木香

白茯苓

藿香

縮砂人

肉豆蔻

萹澄茄

甘草

炙各半兩

乾山藥

一兩

陳皮

白

青皮

去白各一分

右為細末每服一二錢木瓜湯點服空心鹽湯點

亦得

溫中降氣丸 治脾胃不和不思飲食心腹滿悶腹

脇刺痛嘔吐痰水噫醋吞酸飲食遲化或逆氣上

衝或中滿虛痞胸膈不利常服消痞快氣進美飲

食

京三稜 煨

蓬莪朮

青皮 白去

陳皮 去穢

乾薑 炮

良薑 剉

吳茱萸 湯洗

木香 已上各一兩

右為細末水煮熟麩糊和丸如梧桐子大每服六七

十丸食後生薑湯送下

寬中丸 治氣不升降痰涎鬱塞飲食不化

檳榔 麩裏煨熟

木香 二兩

半夏 二兩牛

陳橘皮

青橘皮 各半兩

京三稜 七錢半

牽牛

四兩微炒取頭末二兩

右件爲細末水煮麩糊爲丸如梧桐子大每服五

十九食後生薑湯下

調中丸 剖判清濁升降水土流濕潤燥消飲除痰

赤茯苓

白朮

桔梗 剉

澤瀉

陳皮 白去

乾葛 各一兩

滑石

枳殼 麩炒去穢

半夏 湯洗七次焙各一兩半

豬苓 去皮

黃芩

木通 各二分

黑牽牛一兩

乾生薑三錢

右爲細末白麵糊和丸如梧桐子大每服五十丸

生薑湯送下食後服

均氣散 治三焦滯滯氣不宜通

木香

桔梗剉炒

廣茂

木通

各半兩

枳殼

剉炒去穢

青皮

去白各一錢半

京三稜

剉

甘草

炙各一兩

石爲細末每服三錢水一盞生薑三片同煎至七

分去滓食前溫服

十全丸

治心腹痞悶脇肋脹滿食少多傷

檳榔

枳殼然炒去穰

青皮

陳皮白

京三稜

茂炮

縮砂人各二兩

丁香一兩

木香一兩

香附子炒四兩

右為細末麵糊和丸如梧桐子大每服五十九溫

粥飲送下空心食前服

無礙丸 治脾胃受濕橫流四肢手足皆腫

連皮大腹子一兩

京三稜二兩濕紙裹火煨熟剉

蓬莪茂二兩炮剉

檳榔半兩

木香一兩

右為細末炒麥蘖麵糊和丸如梧桐子大每服五

十九溫生薑湯下食後

尅效聖餅子 治積痰停飲留滯不散胃中噎悶膈

肋刺痛噫醋吞酸不嗜飲食及宿有沉積攻衝膈

脘痞悶並宜服之

安息香

研

南乳香

研

丁香

木香

川薑

炮

石三稜

剉各半兩

高良薑

荆三稜

炮

蓬莪茂

剉

粉霜

研各一兩

乾漆

炒一兩并碎

硃砂

半兩

右件藥一十二味除研藥外搗羅爲細末和勻用

石腦油溫就和丸如菜豆大捻作餅子每服五

餅至七餅食後溫熱水送下

沉香人腹皮散 治脚氣腫滿沉重疼痛筋脈不利

此證皆由濕氣鬱滯經絡所致服之宜通經絡使上下無礙血氣和平腿脚輕利為效

連皮大腹子三兩

沉香剉

檳榔剉

桑白皮剉微炒

烏藥剉

荆芥穗

陳皮洗去穢焙乾秤

茴香炒

白茯苓去皮

木通剉

紫蘇子炒微

紫蘇葉

甘草炒各一兩

乾木瓜二兩半去穢

枳殼越炒一兩半

右件一十五味為麤末每服五錢水一盞生薑五

片蘿蔔五大片同煎至七分去滓溫服食前日
 進二服十日之後一日進一服病愈即止如無
 蘿蔔用蘿蔔子一分微炒搗碎同煎代之如覺
 大便乾燥即服加減神功丸

木香檳榔丸 疎導三焦寬利胸膈破痰逐飲快氣
 消食通潤大腸

木香

檳榔

枳殼麩炒

杏人去皮尖麩炒

青皮去白各一兩

半夏麩

皂角去皮炙

郁李人去皮各二兩

右為細末別用皂角四兩用漿水一椀搓揉熬膏

更入熟蜜少許和丸如梧桐子大每服五十九
食後溫生薑湯下

木香枳實丸 治濕飲停積胸膈痞悶消痰快氣宿
食遲化

木香

枳實炒

乾生薑各一兩

白朮

澤瀉

縮砂人

檳榔

青皮法

赤茯苓去皮

半夏湯洗七次
各三兩

右爲細末水煮麵糊爲丸梧桐子大每服七八十

丸溫生薑湯下

鐵甕申先生交感丹 俞居易侍郎傳世人中年精

耗神農常言百事心灰蓋緣心血少而火不能下
降於腎腎氣憊而水不能上升至心中焦隔絕榮
衛不和所苦者上則心多驚悸中則寒痞飲食減
少下則虛冷遺泄甚至於陰痿不興藏氣滑泄愚
醫徒知峻補下田非獨失真不能生水滋心而建
僞立見衰悴夭折之由當自此始悲夫所以處此
方廣濟迷惑然不可忽此藥品志心服之半年屏
去一切暖藥又不可恃此而馳嗜慾然後力習秘
固泝流之術其神效不可殫述質之天地切勿妄

傳居易之祖通奉遺訓云予年五十一歲過鐵甕
先生授此秘術酷志行持服食一年大補平日所
服暖藥一切屏盡而飲食嗜好不減壯歲此藥力
之功大矣今年八十五享天然之壽瞑目無憾獨
此藥傳之理當普示羣生同登道果藥後有湯與
牙藥同用之

茯神兩

香附子

一斤去毛用新木
浸一夕妙令黃色

右爲末煉蜜和丸如彈子大每服侵晨一九以後

降氣湯嚼下

降氣湯

茯神二兩

香附子

半斤炒
浸如前

甘草

一兩半
炙黃

右為細末每服一分沸湯點服下

牙藥

香附子

五兩

右以生薑三兩研和滓汁浸香附子三錢炒焦黑

存性為末以青鹽二錢拌勻揩牙

順氣丸 治風濕毒氣攻疰腿膝或腫或疼降氣消

食

木香

青皮去

檳榔

各一兩

黑牽牛

炒取頭末
三兩半

郁李人

湯浸去皮
別研半兩

麻子人一兩半去皮別研

右六味除麻子人郁李人外爲細末入麻子人郁李人末同研勻細煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸加至五十九丸溫麻人湯下或用生薑湯下亦得

和中丸 治脾胃怯弱陰陽不和三焦氣滯心腹痞悶嘔逆痰甚頭目不清困倦少力飲食減少肌體瘦瘁肢節煩疼常服和中順氣升降陰陽消痰止嘔長肌退困美進飲食

藿香葉

人參

陳皮各一兩

丁香兩半

木香兩半

白朮兩二

白茯苓去皮二兩

半夏二兩湯洗

巴豆二錢半與砂皮同炒焦不用巴豆

右件為細末水煮麵糊和丸如梧桐子大每服五

十九煎生薑湯下食前

大華澄茄丸 和脾胃美進飲食治腹胸虛滿消積

滯化痰飲

葶澄茄兩一

青皮白法

陳皮白法

廣茂煨

川丁皮

厚朴去粗皮製各二兩

赤茯苓去皮四兩

麥蘖炒三兩

半夏湯洗七次二兩

右爲細末生薑汁麴糊爲丸如梧桐子大每服六
七十九不拘時候溫生薑湯下

御藥院方卷第三